

Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар облыстық жедел медициналық көмек станциясы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Қазақстан Республикасы
140003 Павлодар қаласы
Абай көшесі, 115 үй
тел./факс: 32-87-88

Коммунальное государственное предприятие на ПХВ «Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи»
управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Республика Казахстан
140003 г. Павлодар
ул. Абая 115
тел./факс: 32-87-88

Хаттама
от 12 февраля 2019г

Протокол
№3
г.Павлодар

Заседание комиссии по закупке дезинфицирующих средств по Постановлению 1729 от 30.10.2009г (с изменениями на 08.11.2017г)

Комиссия в составе:

Председатель: Мищенко И.Б. - зам. главного врача

Члены комиссии: Вербовая О.Б. - зам главного врача по аудиту

Арынова К.А. - бухгалтер по гос. закупкам

Абиев А.Б. - юрисконсульт

Юнгова Ю.В. - главная мед. сестра

Байжигитова Г.А. - провизор

подвела итоги закупки дезинфицирующих средств по Постановлению № 1729 от 30.10.2009г (с изменениями на 08.11.2017г)

1. Наименование, краткое описание, цена закупаемого товара составляет:

№ лота	Наименование	тех. характеристика	ед. изм	цена
1	Жидкое мыло с антисептическим эффектом 1 литр	Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве активно действующих веществ должно содержать полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид не менее 0,2%, а также натрий лаурет сульфат не менее 5,2%, кокомид ДЭА не менее 1,0%, натрий хлорид не менее 2,2%, перламутровый концентрат, кислоту лимонную и воду. Средство не должно содержать бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. pH 10%-ного раствора средства должен быть в интервале от 5,0 до 7,0. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.Coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности средства должен быть не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1-л.	амп	1840
2	Дезинфицирующие салфетки	Средство должно представлять собой дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен), пропитанные дезсредством, содержащим в качестве ДВ н-пропиловый спирт не менее 9,0%, изопропиловый спирт не менее 9,0%, бензалконий хлорида не менее 0,25%, N,N-Bis(3-аминопропил)диэтиламины не менее 0,3%, натуральный природный антимикробный компонент	таб	7360

		нарингенин-халкон не менее 0,25%, ПАВ и вспомогательные компоненты. рН средства должен быть в интервале 9,0%-11,0%. Пропиточный состав не должен содержать соединений, фиксирующих протеиновые загрязнения (спирты в концентрации более 18%, альдегиды), активных ингредиентов с эффектом остаточного действия (гуанидины, амины), высокой токсичности (производные хлора, кислорода, кислот, фенола). Антимикробная активность: в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>), кишечных инфекций, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/H1N1, А/H5N1), аденовирусов, ротавирусов.		
3	Дезинфицирующее средство(концентрат) 1 литр	Дезерство в качестве АДВ должно содержать гликолевую кислоту не менее 15,7%, бензалконий хлорид не менее 11,5%, моноалкилфенол оксизилированный, кислоту фосфобутан-1,2,4-трикарбоновую и воду. Средство не должно содержать третичных аминов, гуанидиновых оснований, альдегидов, перекиси водорода, спиртов и хлора. рН раствора с массовой долей 10,0 % должен быть в интервале от 1,5 до 3,5. Средство должно обладать бактерицидным (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидным, фунгицидным, а также спороцидным действием. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования; ДВУ жестких и гибких эндоскопов; дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах);дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН. Средство должно быть разрешено для использования в специализированных моечных машинах и в отделениях эндоскопии. Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 15 суток.	амп	6348
4	Дезинфицирующее средство (готовый раствор)1 литр	Дезерство (готовый раствор) должно содержать в своем составе не менее 7,3% перекиси водорода и 0,23% надуксусной кислоты в качестве действующих веществ, ингибитор коррозии и другие функциональные добавки. рН средства должен быть в интервале 1,8% - 2,2%. Средство должно обладать спороцидными, бактерицидными, туберкулоцидными, вирулицидными и фунгицидными свойствами. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции ИМН; дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним после применения у инфицированных больных при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях; для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких эндоскопов ручным, автоматизированным способом в моющих-дезинфицирующих машинах (МДМ); стерилизации ИМН. Средство должно обладать следующими режимами дезинфекции и стерилизации ИМН ручным и автоматизированным в МДМ способом: дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях не более 10 минут; ДВУ не более 5 минут; стерилизация ИМН не более 15 минут. Срок годности не менее 2-х лет, возможность многократного использования не менее 31 дня.	фл	28037
5	Кожный антисептик на основе спирта 120мл спрей	Дезерство (кожный антисептик) в качестве АДВ должен содержать не менее 70 % масс этанола, а также трет-бутиловый спирт, изопропанол и функциональные добавки для ухода за кожей рук. Средство не должно содержать красителей и ароматических отдушек. рН должен быть 6,8% – 7,3%. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием 3 часа. Средство должно быть предназначено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров. Флакон объемом не менее 120 мл. Срок годности не менее 3-х лет	фл	1265
6	Салфетки дезинфицирующие без содержания спирта	Дезинфицирующие салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза), грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных и кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, ВИЧ-инфекцию, вирусов гриппа и парагриппа человека, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1), вирусов «атипичной пневмонии», вирусов герпеса и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон. Размеры салфетки 135*185мм ведро 300шт. Срок годности 36 месяцев.	амп	6790

7	Салфетки дезинфицирующие	Салфетки представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала, белого цвета со слабым специфическим запахом спирта и применяемой отдушки. Каждая салфетка пропитана готовым к применению дезинфицирующим средством в количестве 3 г на одну салфетку. В качестве действующих веществ пропиточный раствор содержит пропанол-1 28%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,02%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,04%, N,N-бис(3-аминопропил)диэтиламин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и воду. Размер салфеток 135*185. Ведро с количеством салфеток 300 штук в ведре. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций), вирусов (в отношении всех известных вирусных патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Салфетки активно разрушают на поверхностях биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами. Пропиточный состав средства быстро высыхает, обладает пролонгированным эффектом не менее трех часов, не портит и не оставляет на обработанных поверхностях следов, не требует смывания, обладает дезодорирующими свойствами. Салфетки предназначены для применения в лечебно-профилактических организациях любого профиля, в том числе стоматологических кабинетах, кабинетах диагностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях, офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных ситуаций, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (офисы, парикмахерские, гостиницы, прачечные, общепит, потребительские и промышленные рынки, сауны, салоны красоты, общественные туалеты и др.), в учреждениях образования, отдыха, спорта (фитнес-центры, бассейны, оздоровительные спорткомплексы и др.), культуры (концертные залы и др.), на предприятиях социального обеспечения (санаторно-курортные учреждения, дома престарелых, инвалидов и др.), в пенитенциарных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, пищевой промышленности, в ветеринарных учреждениях, на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, населением в быту для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью (кроме изготовленных из материалов, подверженных воздействию спиртов) Средство должно представлять собой готовый к применению раствор в виде кожного антисептика. В качестве действующих веществ содержит спирт изопропиловый не менее 70%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 0,2% и полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида не менее 0,1%, а также вспомогательные компоненты (глицерин не менее 1,0%, вода питьевая). Также качестве красителя должен содержать бриллиантовый зеленый не менее 0,01 %. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на <i>Mycobacterium</i> spp.), вирусов (включая парентеральные гепатиты В, С, D, ВИЧ-инфекции, грипп, в т.ч. А H5N1, H1N1), патогенных грибов (возбудителей дерматомикозов и кандидозов). Средство предназначено: - для обработки рук хирургов: двукратное нанесение не более чем по 5 мл при времени обработки не более 3 минут; - для обработки операционного поля, локтевых сгибов доноров методом протирания двукратно - при времени обработки не более 2 минут; - для обработки инъекционного поля методом протирания при времени экспозиции не более 1 минуты; - для гигиенической обработки рук: не менее 3 мл при времени обработки не более 30 секунд; - для дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования методом однократного протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не	рулон 8400
8	кожные спиртовые антисептики	фл 5100	

		более 5 минут, при туберкулезе (<i>Mycobacterium</i>) - не более 60 минут; -для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, игрушек методом двукратного протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не более 15 минут, при туберкулезе (<i>Mycobacterium</i>) - не более 60 минут. Средство должно представлять собой готовую к применению жидкость. Пенящуюся при встряхивании со слабым запахом отдушки. Должно наносится в виде пены, а также в жидком виде. В качестве действующего вещества должно содержать полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не менее 2,5% и не более 3,5%, а также увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки. pH средства в пределах не менее 5,0 и не более 7,0. Средство должно обладать бактерицидной (в том числе в отношении микобактерий туберкулеза),-вирулицидной (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В, С ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.) и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и трихофитии. Средство должно сохранять свои свойства после замораживания и последующего оттаивания. Для обработки твердых поверхностей с получением бицидного эффекта требуется применение жидкого мыла способом протирания и погружения. Смывание остатков раствора с обработанных поверхностей не требуется. Для гигиенической обработки рук. Средство представляет собой таблетки весом не менее 3,14 и не более 3,5 гр. выделяющие при растворении не менее 1,4 и не более 1,64 гр. активного хлора. Средство содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХИЦК) в количестве не менее 84%. Массовая доля активного хлора при растворении в воде не менее 42,5% и не более 48,5%. Распадаемость одной таблетки не менее 3,5 минут и не более 6,5 минут. Срок годности рабочих растворов не менее 6 суток. срок годности средства не менее 3 года Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, паратриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) и грибов рода Кандида и дерматофитов; средство эффективно в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, легионеллез); средство обладает спороцидной активностью, в том числе в отношении спор возбудителей сибирской язвы; средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц). Средство должно сопровождаться: Вкладышем-инструкцией для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. Средство обладает моющим эффектом. Форма выпуска: банка полимерная вместимостью не менее 1 килограмма. в таблетках		
9	Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом	Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, паратриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) и грибов рода Кандида и дерматофитов; средство эффективно в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, легионеллез); средство обладает спороцидной активностью, в том числе в отношении спор возбудителей сибирской язвы; средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц). Средство должно сопровождаться: Вкладышем-инструкцией для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. Средство обладает моющим эффектом. Форма выпуска: банка полимерная вместимостью не менее 1 килограмма. в таблетках	фл	5500
10	средство дезинфицирующее, хлорсодержащее	Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, паратриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) и грибов рода Кандида и дерматофитов; средство эффективно в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, легионеллез); средство обладает спороцидной активностью, в том числе в отношении спор возбудителей сибирской язвы; средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц). Средство должно сопровождаться: Вкладышем-инструкцией для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. Средство обладает моющим эффектом. Форма выпуска: банка полимерная вместимостью не менее 1 килограмма. в таблетках	фл	4200
11	средство дезинфицирующее, не содержащее хлор	Средство представляет собой круглые таблетки белого цвета средней массой: 1,0±0,1; В качестве действующего вещества полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 26±1,5, а также другие синергетические и функциональные компоненты. Срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 28 суток при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство фасуют в банки из полимерных материалов вместимостью до 1 кг с плотно закрывающимися крышками. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции; средство обладает	фл	7750

		спороцидной активностью. Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны. Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами. Средство имеет государственную регистрацию.		
12	кислородсодержащие дезинфицирующие средства	Средство представляет собой жидкий концентрат. В качестве действующих веществ содержит перекись (пероксид) водорода не менее 16,5% и не более 20,5%, дилецилдиметиламмоний хлорид не менее 3,5% и не более 6,0%. Не содержит гуанидиновых соединений, активного хлора, альдегидов, аминов и кислот. рН 1%-го водного раствора в пределах от 5,0 до 6,0 ед. Срок годности рабочих растворов не менее 35 суток. Средство не требует ротации. Обладает пролонгированным эффектом не менее 5 часов. Средство должно эффективно разрушать биопленки и препятствовать их образованию. Средство обладает бактерицидной (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей анаэробных и внутрибольничных инфекций (Метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), Ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE), синегнойной палочки), спороцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Количество рабочего раствора, приготавливаемого из одного литра концентрата: - для дезинфекции поверхностей при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях не менее 2000 литров при времени экспозиции не более 120 минут и не менее 100 литров при времени экспозиции не более 15 минут; - для дезинфекции поверхностей при инфекциях вирусной этиологии не менее 400 литров при времени экспозиции не более 120 минут и не менее 50 литров при времени экспозиции не более 15 минут; - для дезинфекции поверхностей при поражениях плесневыми грибами не менее 50 литров при времени экспозиции не более 15 минут; - для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним не менее 33,3 литра при времени экспозиции не более 90 минут и не менее 14,2 литра при экспозиции не более 15 минут; - для стерилизации ИМН и эндоскопов не менее 25 литров при времени экспозиции не более 90 минут и не менее 12,5 литров при времени экспозиции не более 15 минут. Дезинфекция высокого уровня эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, отечественного и импортного производства при концентрации рабочего раствора (по препарату) 8% составляет 5 мин и стерилизация 15 мин	фл	6750
13	Салфетки сухие для уборки (размер 135*360мм) сетка	Готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала представляют собой вспомогательный материал для использования при дезинфекции и очистке. В качестве пропиточного состава салфеток рекомендуется использовать рабочие растворы средств Стандартная упаковка: перфорированный рулон салфеток (160 шт.) в герметичной полимерной упаковке или в пластиковом контейнере с крышкой и дозирующим клапаном. Салфетки обладают высокой прочностью; при использовании не рвутся, не сбиваются в комки и не оставляют следов на обработанной поверхности; совместимы с материалами медицинского оборудования. 1.2. Область применения нетканых салфеток - лечебно-профилактические (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, фтизиатрические отделения, отделения реабилитации), стоматологические, фармацевтические, аптечные и другие учреждения здравоохранения; - инфекционные очаги; - объекты социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного назначения (включая санатории, фитнес центры, бассейны, аквапарки, бани, сауны и др.); - предприятия индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты и др.);	фл	3800

		- детские учреждения, социальные и пенитенциарные учреждения; - все виды транспорта; - предприятия общественного питания и торговли; Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до жёлтого цвета, содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) : N, N-бис-(3-аминпропил) додециламин – 0,7 %, дидецилдиметиламмоний хлорид 2,7%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид- 0,7 % и другие функциональные компоненты. pH 1% водного раствора - 8,0-10,0. Срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов - 28 суток при условии их хранения их в закрытых емкостях.		
14	Средство дезинфицирующее (в комплекте с индикаторными полосками -50полосок на одну коробку)		фл	4190

2. Дата и время представления ценового предложения

№	Наименование поставщика представившее ценовое предложение	Дата представления	Время представления
1	ТОО «Adlet Medical»	04.02.2019г	12:00
2	ТОО «ХимГastroНорм»	05.02.2019г	10:00
3	ТОО «StrauB»	06.02.2019г	11:40
4	ТОО «НПО МедиДез»	06.02.2019г	15:50

3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупки:

ТОО «НПО МедиДез» Костанайская обл., г.Рудный, ул.топоркова,39/1 сумма договора 2842524;

ТОО «ХимГastroНорм» г.Павлодар ул.Ломова,167 кв32 сумма договора 9353500;

4. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали представители поставщика ТОО «НПО МедиДез», представитель поставщика ТОО «StrauB»

Победитель в соответствии п.113 Главы 10 Правил Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009года (с изменениями на 08.11.2017г)

предоставляют заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Председатель:

Члены комиссии

Мищенко И.Б. _____
 Вербовая О.Б. _____
 Арынова К.А. _____
 Абиев А.Б. _____
 Юнгова Ю.В. _____
 Байжигитова Г.А. _____

